Rebut

Remarque sur un Bec de Lievre apporté de naissance en mars 1760.

un vigneron de cette ville me pria d'aller voire son enfant qui venoit de n'aitre pour examiner cequi pouvoit l'empêcher de teter. je luy trouvai un Bec de Lievre des plus singulier. L'os maxillaire et la levre superieure se trouvoints separé de chaque coté, à l'endroit des dents canines, ces fentes montoints jusque sous les ailles du nez ou elle se terminoits à l'exterieure; en faisant ouvrire la bouche de l'enfant on ne voyoit aucun vestige de voute du palais, sinon la rainure qui se trouver le long le long des os Maxillaires et des os du palais; par ce grand vide on découvroit la partie inferieure du vomer. Les conduits du nez dans la bouche étant à découverts devenoints la cause que l'enfant rendoit par le nez tout ce qu'on pouvoit luy donner pour le soutenir, les separations de l'os maxillaire et de la levre superieure formoits trois levres, celle du millieu fermoit par ces allongements Les separations de l'os maxillaire, les ailles du nez tomboits sur celle cy, et cachoits les parties supperieure des fentes.

ARC 53
n° 63

sous la portion de la levre du
millieu, immediatement sous le néz,
il se trouvit dans sa partie interne une
écroissance de chaire, gros comme
un gros pois rond de la même
figure laquelle étant relevé on
appercevoit deux dents incisive
naissante; lorsqu'on laissoit
l'enfant tranquille rien ne
paroissoit extraordinaire toutes
ces fentes se trouvant recouverte
par les allongements de la portion
de la levre du milieu ne representoit
qu'une sicatrice. Mais lorsqu'on
le faisoit crier il devenoit y deux,
on voyoit toutes les parties que je
viens de decrire, souvrire s'écarter
l'une de l'autre et offroit un
spectacle effrayant, on ne
pouvoit plus distinguer de machoire
supperieure, on ne voyoit plus
qu'un vuide au lieu de palais
qui repondoit jusqu'au gosier.
L'enfant n'a vecu que 48. heures.

Lamotte

Ch. de l'hotel Dieu
de Boulange sur mer

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

N.° 110.